


Les kystes sont observés au niveau des poumons (voir «malformations pulmonaires») ou du médiastin (zone centrale du thorax à proximité du cœur, de l'œsophage, et de la trachée).

Les sont souvent observées avant la naissance lors des échographies de surveillance de la grossesse.




- **Les diagnostics les plus fréquents sont:**

Kyste bronchogénique

Lésion arrondie à contenu liquidien dont l'enveloppe ressemble à du tissu respiratoire.

Le plus souvent au contact de la trachée ou des bronches.



Duplication oesophagienne

Lésion arrondie à contenu liquidien dont l'enveloppe ressemble à du tissu intestinal. Le plus souvent au contact de l'œsophage.



Malformation adénomatoïde kystique pulmonaire (MAKP)

Amas de kystes qui refoulent le reste du poumon. La lésion peut être volumineuse en cours de grossesse puis diminuer au dernier trimestre.



Evolution

Les kystes peuvent augmenter de taille et gêner la respiration ou la déglutition, peuvent s'infecter, peuvent se transformer en tumeur.

Situations les plus fréquentes

Diagnostic avant la naissance. Enfant asymptomatique. Exérèse dans les premières années pour éviter une complication.

Situations plus rares

Découverte plus tardive lors d'une infection, d'une gêne à la déglutition ou à la respiration, ou lors d'une observation fortuite sur une radio ou un scanner fait pour une autre raison. Une exérèse est envisagée plus ou moins précocement en fonction des circonstances.

Le service de Chirurgie Pédiatrique du CHU Félix Guyon à Saint-Denis prend en charge toutes les malformations pulmonaires.

Pour des informations plus complètes :



Je consulte le portail de la Haute Autorité de Santé (HAS)

=> [Ce protocole national](#) de diagnostic et de soins, de soins d'un enfant avec malformation pulmonaire congénitale.

Je consulte le site de référence nationale maladie rares concernées

=> [RespiFil](#)

Docteur Jean-Luc Michel

Chirurgie viscérale pédiatrique CHU Félix Guyon (Réunion)