


Kyste du cordon



Un kyste du cordon est comme la hernie inguinale et l'hydrocèle lié à une anomalie dans la fermeture du canal péritonéo-vaginal.

Ce canal permet au testicule, pendant la vie fœtale, de migrer depuis l'abdomen jusqu'au fond des bourses.



Le liquide contenu de façon normale dans l'abdomen se retrouve emprisonné au sein du canal. Le diagnostic du kyste du cordon est clinique et ne nécessite aucun examen complémentaire, notamment pas d'échographie. Il existe une boule au dessus du testicule, indolore.

Il n'y a aucun risque de complication quelque soit le volume de ce kyste.

Du fait de l'absence de risque et de la possibilité de guérison spontanée (par fermeture de ce canal péritonéo-vaginal), un geste chirurgical n'est proposé qu'après l'âge de 3 ans.

La chirurgie est le plus souvent réalisée en chirurgie ambulatoire, sous anesthésie générale.

L'incision se fait dans le pli inguinal et l'intervention consiste à lier le canal après l'avoir séparé des vaisseaux allant au testicule.

En post-opératoire, il y a un pansement à laisser une semaine, les fils sont résorbables. Il n'y a donc pas de soins infirmiers à prévoir.

Les complications sont rares et sont les mêmes qu'après une cure de hernie inguinale.

Rédacteur: Pr Frédérique SAUVAT, service de chirurgie pédiatrique

CHU Nord Félix Guyon

