



Fiche reflexe BRULURE PEDIATRIQUE

Page 1/2

>> moins de 15 ans (sinon contacter astreinte adultes)



Heures ouvrables
contact & prise de rdv

Secrétariat : **0262 90 57 70**
De 8h00 à 14h00 (lundi au vendredi)
sec.grd.brules@chu-reunion.fr

Indication transfert immédiat pour évaluation spécialisée
ou hospitalisation



une brûlure peut être grave selon plusieurs critères indépendants
= bien évaluer la gravité globale (pas juste étendue et aspect)

- Atteinte main/ visage /périnée
- Brûlure profonde (immersion, flamme, huile, contact direct...)
- Brûlure chez enfant < 1 an (rea ped si plus de 5% de la Surface Corporelle Totale)
- Brûlure étendue avec plusieurs zones de pansement même surface limitée
(surveillance antalgique et tolérance des pansements)
- Contexte familial ou personnel complexe ou douteux

Au moindre doute ne pas hésiter à appeler pour un avis :

- soit sur l'astreinte via le standard du CHU si urgent
- soit au secrétariat si besoin orientation ou conseils non urgents

"Mieux vaut adresser à tort que de prendre du retard sur la prise en charge initiale."



Coordonnées 24/24h 7/7j
(**si urgence**, uniquement pour les
professionnels de santé) :

Astreinte chirurgie pédiatrique
viscérale / Plastique / Brûlés
Standard CHU NORD **02 62 90 50 50**



BRULURE PEDIATRIQUE

>> moins de 15 ans (sinon contacter astreinte adultes)



Heures ouvrables
contact & prise de rdv

Secrétariat : **0262 90 57 70**

De 8h00 à 14h00 (lundi au vendredi)

sec.grd.brules@chu-reunion.fr

Consignes pansement initial



Pas de gras pas de flammazine

- Lavage eau et savon neutre (+/- antiseptique type chlorhexidine moussante)
- Rinçage eau claire
- Tamponnement, pas de frottement des plaies
- Phlyctène à percer mais pas retirer (conserver +++ sans percer sur pulpes)
- Interface neutre au contact de la plaie (conforman, mepitel, urgotul...)
- Compresse légèrement humide (pas trempée sinon macération) avec chlorhexidine aqueuse diluée à 0.1% à 0.5% max (dosette 2% ou diaseptil spray 0.5%)
- Bandage velpeau occlusif avec position d'extension cutanée maximale pour éviter les rétractions
- Ne pas trop serrer car œdème mais nécessité de stabilité +++ du pansement éventuellement renfort avec ellastomull ou filet
- Ne pas refaire tous les jours car délétère pour cicatrisation
- Si pansement bien stable à refaire toutes les 48 ou 72h en milieu spécialisé



Coordonnées 24/24h 7/7j
(si urgence, uniquement pour les professionnels de santé) :

Astreinte chirurgie pédiatrique
viscérale / Plastique / Brûlés

Standard CHU NORD **02 62 90 50 50**

